

Міністерство охорони здоров'я України
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Університетська клініка
Відділення Хвороб Хірургічного Профілю
м. Київ, В. Винниченка, 9
тел. (044) 486 6948

Виписка із історії хвороби стаціонарного хворого № 1941/810

П.І.Б. Брига Олександр Геннадійович

Дата народження: 24.04.1980р.н.

Місце проживання: м. Київ, р-н. Солом'янський, вул. Солом'янська 10, кв. 88

Місце роботи, посада: в/ч А2900

Дата госпіталізації: 15.06.2026

Дата виписки: 19.06.2026

Основний діагноз: Аксиальна кила стравохідного отвору діафрагми I-II ступеня, пролабування $\frac{1}{2}$ об'єму дна шлунка. Дуоденогастральний рефлюкс. Дифузний пневмосклероз. Стан після операції атипичної резекції S1-S2 лівої легені 08.10.2025р. з приводу видалення новоутворення лівої легені.

Анамнез хвороби: Зі слів пацієнта, біля 1-го року тому звернув увагу на печію, тяжкість після вживання їжі, нудоту. В плановому порядку виконав ФГДС: діафрагмальна кила. Звернувся до хірургічного відділення Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця, обстежений, госпіталізований для хірургічного лікування.

Результати обстежень

Загальний аналіз крові: Hb 167 г/л, ер $5,15 \times 10^{12}/л$, лейкоцити $5,88 \times 10^9/л$.

Біохімічний аналіз крові: глюкоза 5,3 ммоль/л.

Коагулограма: протромбіновий час 14,2с, протромбіновий індекс 73,9%, МНВ 1,18, АЧТЧ 26,5 сек, фібриноген 3,0 г/л.

Проведене лікування:

Оперативне лікування: 15.06.2026р.: Лапароскопічна герніопластика грижі стравохідного отвору діафрагми, задня круропластика, фундоплікація за Ніссеном.

Інфузійна терапія, цефазолін, метронідазол, парацетамол, клексан, кейвер, проксіум, метоклопрамід.

Післяопераційні рани загоюються первинним натягом.

У задовільному стані пацієнт виписаний зі стаціонару та потребує направлення на ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.


Рекомендації при виписці:

1. Амбулаторне спостереження лікаря-хірурга за місцем проживання.
2. Обмеження фізичних навантажень протягом 2-3 місяці.
3. Медикаментозне призначення: дексалгін 25 мг 1 таб при болю, нольпаза 40мг протягом 10 днів.
4. Контрольний огляд лікаря-хірурга та зняття швів за 10 днів.

Лікар-хірург, доцент

в/о Зав. ВХХП

Лікар-інтерн



Цимбалюк Р.С.

Макеев Р.О.

Панасюк Р.В.

