

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я Міністерство Охорони Здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма первинної облікової документації № 027/о
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма КНП "Коростишівська ЦРЛ ім. Д.І. Потехіна" Коростишівської міської ради 12502, Коростишів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 58	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ 01991731	1402012 № 110

ВИПИСКА із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 5896

У КНП "Коростишівська ЦРЛ ім. Д.І. Потехіна" Коростишівської міської ради, 12502, Коростишів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 58/

(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого Литус Денис Васильович

2. Дата народження 01011991
(число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: вулиця Рити Нещадименко 9 м.Шпола, Черкаська область, Україна

4. Місце роботи (посада) ЗСУ ВЧА2900 солдат

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:
захворювання

направлення в стаціонар

б) у стаціонарі: надходження: 06.07.2026 17:15 в Інфекційне відділення

виписки або смерті: 15.07.2026 09:07 з Інфекційне відділення

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):

Назва Діагнозу		Код за МКХ-10 АМ
Основний	Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними агентами Негоспітальна правобічна нижньодолева пневмонія, III кл.гр, середнього ступеня важкості	J16.8
Ускладнення	Респіраторна недостатність, тип I ДН 0-I	J96.90
Супутній	Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51 †) Остеохондроз хребта з переважним ураженням попереково-крижового відділу, стадія загострення. Протрузії міжхребцевих дисків у сегментах С6_С7, Th7-Th8, L5-S1. Радиклопатія L5, S1 ліворуч. Вторинний корінцевий синдром, рефлекторний синдром із м'язово-тонічним компонентом. Правобічний сколіоз ГВХ Іст Статодинамічні порушення ПФХ II (др.) ст.	G55.1
Супутній	Фактори, пов'язані з умовами праці	Y96

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці

Скарги:

біль голови, кашель сухий, труднощі при відхаркуванні мокротиння, підвищення температури тіла, пітливість, загальна слабкість. Скарги на кашель частий, малопродуктивний із відходженням в'язкого мокротиння, підвищення температури тіла до 38-39.5с, біль в грудній клітці при кашлі, озноб, ломоту в тілі, швидку втому, задишку при фіз навантаженні, лабільність АТ.

Анамнез хвороби:

Вважає себе хворим близько тижня, приймав парацетамол, ібупрофен, амоксицилін 500 мг 1т 2р/д, німесил, омез, пульмо лор, пульмо бриз.

В анамнезі гіпертонічна хвороба, на постійній основі приймає клосарт 50 мг 1т 1р/д.

В 2020 році виразка 12 п.к.

Скерований для подальшого лікування в інфекційне відділення

Анамнез життя:

Анамнез життя: ВГ (-), ТБС (-), гіпертонічна хвороба

Алергоанамнез: наявність алергії на, на димексид

Об'єктивний стан хворого:

Об-но: загальний стан хворого середньої важкості. Шкірні покриви чисті, блідо-рожеві. Т 38,6°C. Ps 112, ритмічний, задовільних характеристик. Тони серця ритмічні, задовільної гучності, акцент II тону над аортою. АТ 140/90 мм.рт.ст. Дихання над легеньми жорстке, ослаблене в н/в, справа вислуховуються вологі, дрібноміхурцеві хрипи. ЧД 19 в хв. SpO2 95% Живіт м'який, не болючий, доступний глибокій пальпації. Печінка на рівні реберної дуги, не болюча. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Периферичні набряки відсутні. Фіз відправлення в нормі

Об'єктивний статус:

Загальний стан: середньої важкості; Свідомість: збережена; Поведінка: спокійний; Будова тіла: нормостенічна; Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені; Пульс: 98; АТ: 145/90; Частота дихання: 18; Задишка: змішана; Аускультация легень: жорстке, хрипи вологі, справа в нижніх відділах; Тони серця: ритмічні, ясні; Периферичні набряки: відсутні; Язик: вологий, чистий; Огляд шкіри: шкірні покриви та видимі слизові чисті, блідо-рожеві; Живіт: м'який, не болючий; Печінка: пальпується по краю реберної дуги; Селезінка: не пальпується; Симптом Пастернацького: від'ємний, від'ємний з обох сторін

Попередній діагноз:

J15.8, Інша бактеріальна пневмонія

Аналізи:

14.07.2026 - (A34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.24 Т/л (4 - 5 Т/л); Гемоглобін (HGB) - 143 г/л (130 - 160 г/л); Гематокрит (HCT) - 45.1 % (36-48 %); Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 86.1 fL (80 - 99 fL); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 27.3 pg (26 - 32 pg); Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.7 г/дл (32 - 36 г/дл); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 41.7 fL (37 - 54 fL); Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 18.2 % (10 - 17 %); Тромбоцити (PLT) - 258 Г/л (100 - 300 Г/л); Тромбоцит - 0.233 % (0.1 - 0.28 %); Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 9.0 fL (7.4 - 10.4 fL); Лейкоцити (WBC) - 10.3 Г/л (4 - 9 Г/л); Кольоровий показник - 0.81 (0.85 - 1.15); ШОЕ - 5 mm/h (1 - 10 mm/h); Паличкоядерні нейтрофіли - 2 % (1 - 6); Еозинофіли - 2 % (1 - 5 %); Сегментоядерні нейтрофіли - 67 % (47 - 73 %); Лімфоцити - 25 % (19 - 43 %); Моноцити - 4 % (4 - 11 %); Базофіли - 0 % (0 - 1 %); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 11.3 % (11.5 - 14.5 %); Тромбоцит-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 19.0 % (13 - 43 %); Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 49 % (25 - 45 %)

07.07.2026 - A34030 Аналіз: біохімія: Білірубін загальний - 2.31 μmol/L (8.5-25.5 μmol/L) Глюкоза - 6.28 mmol/L (3.9 - 6 mmol/L) Білок загальний - 74.00 g/L (65 - 83 g/L) Креатинін - 73.00 μmol/L (53 - 115 μmol/L) Сечова кислота крові - 278.00 μmol/L (149 - 458 μmol/L) Сечовина крові - 3.10 mmol/L (2.8 - 8.3 mmol/L)

07.07.2026 - (D34006) Білірубін загальний: Білірубін загальний - 2.31 μmol/L (8.5-25.5 μmol/L)

07.07.2026 - (T34005) Глюкоза крові (венозна кров): Глюкоза - 6.28 mmol/L (3.9 - 6 mmol/L)

07.07.2026 - (A34015) Білок загальний: Білок загальний - 74.00 g/L (65 - 83 g/L)

07.07.2026 - (U38006) Ниркові проби (Креатинін+Сечовина+Сечова кислота): Креатинін - 73.00 μmol/L (53 - 115 μmol/L); Сечова кислота крові - 278.00 μmol/L (149 - 458 μmol/L); Сечовина крові - 3.10 mmol/L (2.8 - 8.3 mmol/L)

07.07.2026 - (A35002) Загальний аналіз сечі: Колір - світло-жовтий; Прозорість - прозора (прозора); Питомі вага - 1012 (1000 - 1026); Реакція (pH) - 6.0 (5.0 - 8.0); Білок (г/л) - 0 (не виявлено); Глюкоза (ммоль/л) - 0 mmol/L (не виявлено); Кетонів тіла - +/- (не виявлено); Білірубін - 0 (не виявлено); Лейкоцити - 1.1 /μl (0 - 16 /μl); Еритроцити - 3.4 /μl (0 - 10 /μl); Бактерії - 41.3 /μl (0 - 488 /μl); Циліндри - 0.0 /μl (0 - 1 /μl); Слизи - 0.0 /μl (0 - 137 /μl); Епітелій (плоский) - не виявлено /μl (0 - 24 /μl); Епітелій (неплоский) - 0.0 /μl (0 - 3 /μl); Оксалати кальцію - 0.0 μl (0 - 14 μl); Солі сечової кислоти - 0.0 (0 - 14 μl); Фосфати - 0.0 (0 - 14 μl); Мікроальбумін/креатинін - 3.41 mg/mmol (0 - 3.4 mg/mmol)

07.07.2026 - A35002 Загальний аналіз сечі: Колір - світло-жовтий Прозорість - прозора (прозора) Питомі вага - 1012 (1000 - 1026) Реакція (pH) - 6.0 (5.0 - 8.0) Білок (г/л) - 0 (не виявлено) Глюкоза (ммоль/л) - 0 mmol/L (не виявлено) Кетонів тіла - +/- (не виявлено) Білірубін - 0 (не виявлено) Лейкоцити - 1.1 /μl (0 - 16 /μl) Еритроцити - 3.4 /μl (0 - 10 /μl) Бактерії - 41.3 /μl

(0 - 488 / μ l) Циліндри - 0.0 / μ l (0 - 1 / μ l) Слиз - 0.0 / μ l (0 - 137 / μ l) Епітелій (плоский) - не виявлено / μ l (0 - 24 / μ l) Епітелій (неплоский) - 0.0 / μ l (0 - 3 / μ l) Оксалати кальцію - 0.0 μ l (0 - 14 μ l) Солі сечової кислоти - 0.0 (0 - 14 μ l) Фосфати - 0.0 (0 - 14 μ l) Мікроальбумін/креатинін - 3.41 mg/mmol (0 - 3.4 mg/mmol)

07.07.2026 - А34011 Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.59 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 153 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 48.1 % (36-48 %) Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 86.0 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 27.4 pg (26 - 32 pg) Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.8 г/дл (32 - 36 г/дл)

Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 39.7 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 14.3 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 153 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокріт (PCT) - 0.156 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 10.2 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 3.6 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.82 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 22 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 1 % (1 - 6) Еозинофіли - 3 % (1 - 5 %)

Сегментоядерні нейтрофіли - 70 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 19 % (19 - 43 %) Моноцити - 7 % (4 - 11 %) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 11.0 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 26.7 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 41 % (25 - 45 %)

07.07.2026 - (А34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.59 Т/л (4 - 5 Т/л); Гемоглобін (HGB) - 153 g/L (130 - 160g/L); Гематокрит (HCT) - 48.1 % (36-48 %); Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 86.0 fL (80 - 99 fL); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 27.4 pg (26 - 32 pg); Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.8 г/дл (32 - 36 г/дл); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 39.7 fL (37 - 54 fL); Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 14.3 % (10 - 17 %); Тромбоцити (PLT) - 153 Г/л (100 - 300 Г/л); Тромбокріт (PCT) - 0.156 % (0.1 - 0.28 %); Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 10.2 fL (7.4 - 10.4 fL); Лейкоцити (WBC) - 3.6 Г/л (4 - 9 Г/л); Кольоровий показник - 0.82 (0.85 - 1.15); ШОЕ - 22 mm/h (1 - 10 mm/h); Паличкоядерні нейтрофіли - 1 % (1 - 6); Еозинофіли - 3 % (1 - 5 %);

Сегментоядерні нейтрофіли - 70 % (47 - 73 %); Лімфоцити - 19 % (19 - 43 %); Моноцити - 7 % (4 - 11 %); Базофіли - 0 % (0 - 1 %); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 11.0 % (11.5 - 14.5 %); Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 26.7 % (13 - 43 %); Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 41 % (25 - 45 %)

14.07.2026 - А34011 Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.24 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 143 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 45.1 % (36-48 %) Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 86.1 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 27.3 pg (26 - 32 pg) Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.7 г/дл (32 - 36 г/дл) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 41.7 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 18.2 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 258 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокріт (PCT) - 0.233 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 9.0 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 10.3 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.81 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 5 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 2 % (1 - 6) Еозинофіли - 2 % (1 - 5 %)

Сегментоядерні нейтрофіли - 67 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 25 % (19 - 43 %) Моноцити - 4 % (4 - 11 %) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 11.3 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 19.0 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 49 % (25 - 45 %)

Проведене лікування:

рінгер 200.0 в\в кр. 3 дні(в); прайд при температурі. 2 дні(в); фіз розч 100.0+рафт 4мг в\в кр. 3 дні(в); фіз розч 18.0+цефотаксим 1.0 в\в стр 2р д. 9 дні(в); діклофенак 3.0 в\м 5 днів. 5 дні(в); деспро +фіз розч 18.0 в\в стр 3 дні. 3 дні(в); фіз розч 18.0+омепразол 40мг в\в стр 3 дні. 5 дні(в); В1 В6 В12 в\м 7 днів. 5 дні(в); контрофлекс 2.0 в\м 5 днів. 5 дні(в);

Надані послуги:

07.07.2026 (А34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.59 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 153 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 48.1 % (36-48 %) Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 86.0 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 27.4 pg (26 - 32 pg) Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.8 г/дл (32 - 36 г/дл) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 39.7 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 14.3 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 153 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокріт (PCT) - 0.156 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 10.2 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 3.6 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.82 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 22 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 1 % (1 - 6) Еозинофіли - 3 % (1 - 5 %)

Сегментоядерні нейтрофіли - 70 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 19 % (19 - 43 %) Моноцити - 7 % (4 - 11 %) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 11.0 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 26.7 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 41 % (25 - 45 %) Виконавець:

Кушнір Олена Іванівна

07.07.2026 (А35002) Загальний аналіз сечі: Колір - світло-жовтий. Прозорість - прозора (прозора). Питомо вага - 1012

(1000 - 1026) Реакція (pH) - 6.0 (5.0 - 8.0) Білок (г/л) - 0 (не виявлено) Глюкоза (ммоль/л) - 0 mmol/L (не виявлено) Кетонів тіла - + (не виявлено) Білірубін - 0 (не виявлено) Лейкоцити - 1.1 /μl (0 - 16 /μl) Еритроцити - 3.4 /μl (0 - 10 /μl) Бактерії - 41.3 /μl (0 - 488 /μl) Циліндри - 0.0 /μl (0 - 1 /μl) Слиз - 0.0 /μl (0 - 137 /μl) Епітелій (плоский) - не виявлено /μl (0 - 24 /μl) Епітелій (неплоский) - 0.0 /μl (0 - 3 /μl) Оксалати кальцію - 0.0 μl (0 - 14 μl) Солі сечової кислоти - 0.0 (0 - 14 μl) Фосфати - 0.0 (0 - 14 μl) Мікроальбумін/креатинін - 3.41 mg/mmol (0 - 3.4 mg/mmol) Виконавець: Сахнюк Олена Пилипівна

07.07.2026 (A34030) Аналіз: біохімія: Білірубін загальний - 2.31 μmol/L (8.5-25.5 μmol/L) Глюкоза - 6.28 mmol/L (3.9 - 6 mmol/L) Білок загальний - 74.00 g/L (65 - 83 g/L) Креатинін - 73.00 μmol/L (53 - 115 μmol/L) Сечова кислота крові - 278.00 μmol/L (149 - 458 μmol/L) Сечовина крові - 3.10 mmol/L (2.8 - 8.3 mmol/L) Виконавець: Катрук Регіна Анатоліївна

07.07.2026 (11713-00) Запис усереднених сигналів ЕКГ: Ритм синусовий, регулярний ЧСС 64/хв Електрична вісь серця відхилена вліво Виконавець: Бейдер Катерина Ігорівна

13.07.2026 (58500-00) Рентгенографія грудної клітки: Легеневі поля задовільної пневматизації, без видимих вогнищевих інфільтративних змін. Легеневий малюнок посилений справа. Корені легень структурні не розширені. Сog - Ro норма. Куполи діафрагми чіткі, синуси вільні. Заключення: на момент обстеження без інфільтративно - вогнищевих змін. Виконавець: Мартинюк Ірина Андріївна

14.07.2026 (A34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.24 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 143 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 45.1 % (36-48 %) Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 86.1 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 27.3 pg (26 - 32 pg) Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.7 г/дл (32 - 36 г/дл) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 41.7 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 18.2 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 258 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокріт (PCT) - 0.233 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 9.0 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 10.3 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.81 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 5 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 2 % (1 - 6) Еозинофіли - 2 % (1 - 5 %) Сегментоядерні нейтрофіли - 67 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 25 % (19 - 43 %) Моноцити - 4 % (4 - 11 %) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 11.3 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 19.0 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 49 % (25 - 45 %) Виконавець: Кушнір Олена Іванівна

07.07.2026 (55113-00) Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі: За-ння: Мінімальна недостатність АК -Іст, легке розширення порожнини ЛШ, від 12.05.2025 Перша міська Черкаська лікарня Виконавець: запис в паперовій документації

07.07.2026 (58909-00) Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною: R-заклучення: Фіксована кила (мала) стравохідного отвору діаграми. Рефлюкс-езофагіт. Рубцева деформація цибулини ДПК від 15.06.2025р Лі-р: Наумко М.В. Виконавець: запис в паперовій документації

07.07.2026 (55036-00) Ультразвукове дослідження черевної порожнини: Заклучення: ехо-ознаки збільшення печінки, дифузних змін печінки (стеатоз), метеоризм від 15.05.2025р Лі-р: Задегіголова С.І. Виконавець: запис в паперовій документації

07.07.2026 (96037-00) Інше обстеження, консультування або оцінка: Відеоезофагостародуоденоскопія відл 14.05.2025 За-ння: Ознаки кили СОД Лі-р: Глаговський В.Є Виконавець: запис в паперовій документації

07.07.2026 (30473-00) Панендоскопія до дванадцятипалої кишки: ЕФГДС від 17.06.2025 За-ння: Хітальна кила СОД. Рефлюкс-езофагіт А. Виразка, ерозивний бульбіт та ulcerогенна деформація цибулини 12п.к., Катарально-ерозивна гастродуоденопатія. Дуодено-гастральний рефлюкс Лі-р: Домчук О.М. Виконавець: запис в паперовій документації

07.07.2026 (58500-00) Рентгенографія грудної клітки: ForK №6996 A 1065 від 06.07.2026 За-ння: Посилення легеневого малюнку Виконавець: запис в паперовій документації

07.07.2026 (57903-00) Рентгенографія придаткової пазухи носа: За-ння: незначне пристінкове затемнення обох гайморових пазух № 6886 від 07.07.2026 A 1065 Виконавець: запис в паперовій документації

Консультації суміжних спеціалістів:

10.07.2026 Огляд невролога Федорко Галина Вікторівна Неврологія: Скарги: Скарги на затерпання лівої нижньої кінцівки по боковій поверхні до стопи, біль у поперековому відділі хребта, посилюється при навантаженні; Анамнез хвороби: Хворіє тривало, 2 тижні відмічає загострення; Неврологічний статус: Свідомість збережена, ясна, 15 балів по ШКГ. Орієнтація в місці, часі та особистості повна. Очні щілини D=S. Зіниці D=S. Фотореакція збережена. Рухи очних яблук в повному об'ємі. Конвергенція дещо ослаблена. Геміанопсія відсутня. Диплопія відсутня. Сухожилльні та періостальні рефлекси D=S, ахілові S<D. Порушення чутливості гіпестезія по корінцевому типу L5,S1 зліва. Патологічний рефлекс Бабінського негативний з обох сторін. Менінгеальні знаки негативні. В позі Ромберга атаксія. Координаційні проби виконує

задовільно. Язик по середній лінії. Глотковий рефлекс збережений. Акт ковтання не затруднений. Функцію тазових органів контролює. Емоційна та вегетативна лабільність.

Болючість остистих відростків, паравертебральних точок ПКВХ помірно-виражена. Болючість в ділянці крижово-клубового зчленування зліва. Напруження паравертебральних м'язів ПКВХ помірно-виражене. Симптоми натягу Нері, Мацкевича, Вассермана позитивні, симптом Ласега позитивний зліва <45. Активні рухи в ПКВХ обмежені та болючі.; Діагноз:

Остеохондроз хребта з переважним ураженням попереково-крижового відділу, стадія загострення. Протрузії міжхребцевих дисків у сегментах C6_C7, Th7-Th8, L5-S1. Радикулопатія L5, S1 ліворуч. Вторинний корінцевий синдром, рефлекторний синдром із м'язово-тонічним компонентом. Правобічний сколіоз ГВХ Іст Статодинамічні порушення ПФХ II (др.) ст.; Діагноз (МКХ-10): G55.1 Компресія нервових корінців та сплетінь при ураженнях міжхребцевого диска (M50-M51†); Дані обстежень: МРТ ГВХ, ШВХ, ПКВХ від 12.05.2025р ЄВРОМЕД -на руках; Лікування: ЛФК, Диклофенак 3.0 в\м №5, далі Ексиб 90мг 1т 1р\д 14днів

Кейвер(декспро) 2.0 +фіз-н 18.0 в\в стр №3

Омез 40мг +фіз-н 18.0 в\в стр №3, далі Омез 20мг 1т зранку натще 10днів

Тіонекс 2.0 в\м №5, далі Тізалуд 4мг 1т ввечері 10днів

Віт В1 2.0, В6 1.0, В12 1.0 в\м №7

Ультразвук на ПКВХ з гідрокортизоновою мазю №10;

Стан при виписці: поліпшення.

8. Лікувальні і трудові рекомендації

Обмежити фіз навантаження на 1 міс

Муцитус 300 мг 1т 2р\д, 5-7 днів

Тізалуд 4мг 1т ввечері, 10 днів

Ексиб 90 мг 1т 1р\д, 14 днів

Омез 20 мг 1к зранку, 10 днів

Дата: 15.07.2026

Лікуючий лікар (П.І.Б.): Омецинська Марина Володимирівна

підпис

Завідувач відділення (П.І.Б.): Козловець Ірина Сергіївна

підпис

